



Профилактика ВИЧ-инфекции

ВИЧ-инфекция – это тяжелое инфекционное заболевание человека с поражением иммунной системы, присоединением вторичных инфекций (туберкулез, пневмония и др.), образованием опухолей и прогрессирующим поражением нервной системы.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – последняя стадия ВИЧ-инфекции.

Пути передачи ВИЧ-инфекции:

- Половой – при половых контактах без презерватива с партнерами ВИЧ-положительного статуса.
- Парентеральный – при использовании не продезинфицированных маникюрных инструментов, нестерильных инструментов для татуировки и пирсинга, нестерильных шприцев и игл при внутривенном введении препаратов, переливании инфицированной донорской крови.
- Вертикальный – от ВИЧ-положительной женщины к ребенку во время беременности, родов, через грудное молоко.

ВИЧ не передается:

- бытовым путем;
- при рукопожатиях и дружеских поцелуях;
- при укусах насекомых;
- в транспорте;
- в бассейне.

Вакцина для профилактики заражения ВИЧ отсутствует

Благодаря достижениям современной медицины уже несколько лет, как ВИЧ-инфекция стала управляемым хроническим инфекционным заболеванием, которое не ограничивает продолжительность жизни людей, живущих с ВИЧ.

Пациентам с ВИЧ-положительным статусом назначается антиретровирусная терапия, которая препятствует размножению вируса в организме и улучшает состояние иммунной системы. Раннее назначение антиретровирусной терапии увеличивает продолжительность и качество жизни ВИЧ-позитивных, предотвращает прогрессию ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа, снижает риск передачи инфекции.

ПОМНИ: Основа современной борьбы с ВИЧ-инфекцией – это предупреждение ее распространения. Основной путь передачи заболевания – половой. Чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, следует избегать случайных половых связей и всегда использовать презерватив, если не уверен в сексуальном поведении партнера.



В - ВИРУС
И - ИММУНОДЕФИЦИТА
Ч - ЧЕЛОВЕКА

ВИЧ - инфицированный - практически здоровый человек, в организме которого обнаруживается вирус иммунодефицита человека. Вирус проникает в кровь, поражает лимфоциты. Иммунитет слабеет, потом исчезает совсем. Человек открыт всем болезням. Вот тогда уже говорят о СПИДе.




ВИЧ



СПИД

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита человека. СПИД развивается у людей, заразившихся ВИЧ - инфекцией, и является конечной стадией этого заболевания, которая приводит к летальному исходу (смерти).

**Вирус СПИДа атакует
иммунные клетки**



ВИЧ передается

Через незащищенную половую
связь

Совместное использование
загрязненных шприцев и игл
лицами, употребляющими нарко-
тики внутривенно

Использование нестириль-
ного инструментария для нанесе-
ния татуировок или пирсинга, со-
вместном использовании мани-
кюрных или бритвенных принад-
лежностей

От ВИЧ - инфицированной
матери ребенку во время бере-
менности, родов и кормления
грудью



ВИЧ не передается



Через пот

Через поцелуй

Через общую посуду

Через общую расческу

Через воздух (кашель, чиха-
ние)

Через туалет, душ, бассейн

Через полотенце, одежду,
белье


Через укус комаров и других
кровососущих насекомых



Профилактика СПИДа

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) - это последняя стадия заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

ВИЧ-инфекция: Пути заражения



Вирус иммунодефицита человека

Вирус иммунодефицита человека инфицирует клетки иммунной системы и подавляет или нарушает их функцию. Инфекция приводит к прогрессирующему истощению иммунной системы, разрушая способность организма давать отпор болезням

Во всем мире 36,7 миллиона человек живет с ВИЧ/СПИДом

Как происходит заражение



незащищенный (без презерватива) проникающий половой акт



лечебно-диагностические манипуляции (переливание крови, инъекции)



использование чужих бритвенных принадлежностей с остатками крови



передача вируса от ВИЧ-положительной матери ребенку



использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга



совместное использование шприцев, игл и другого инъекционного оборудования



Тщательно проверять донорскую кровь



Своевременная диагностика для предотвращения передачи от матери к ребенку



Использовать барьерные контрацептивы



Соблюдать и контролировать стерильность медицинских инструментов, использовать одноразовые шприцы



Использовать только свои гигиенические принадлежности